



◆前回情報訂正について

下記内容に誤記載がございました。大変申し訳ありませんでした。

【誤】登録上は、問題ありません。

◆品質向上対策について

資材名	使用倍率	調合量
色一番E	1,000～2,000倍	100～ <u>200</u> g

◆中晩生種落果防止・軟質果防止剤の散布について

【ヒオモン水溶剤】の場合

対象品種	使用倍率	調合量
シナノゴールド	1,000倍	<u>66</u> ml

【正】

◆品質向上対策について

資材名	使用倍率	調合量
色一番E	1,000～2,000倍	100～ <u>50</u> g

◆中晩生種落果防止・軟質果防止剤の散布について

【ヒオモン水溶剤】の場合

対象品種	使用倍率	調合量
シナノゴールド	1,000倍	<u>100</u> ml

◆庭先集荷の対応について

各流通センターでは、事情によりセンターに持ち込みできない方は、庭先集荷を実施しております。ご希望の方は、流通センターにご相談ください。

◆生育状況について

果実肥大は平年より大きめで推移している。8月下旬からの天候不順で、着色は早めから入っているが、あまり進んでいない。また、褐斑病が一部で散見され始めている。

◆当面する重点作業について

1. 土壌が乾燥するとカルシウム欠乏が発生しやすくなる。また、日焼けを助長するため、かん水や葉面散布などの対策を実施する。また、草丈を長すぎず、短くしすぎないようにする。多雨による根痛み対策として、排水対策に努める。※果樹総合情報No.6参照。
2. 徒長枝切り、支柱立てを行い、受光体制、薬剤の掛かりやすい、風通しのよい状態にする。
3. 鳥害対策を行う。※果樹総合情報No.6参照。
4. 樹相に合わせた中生種の着色管理と適期収穫を行う。
5. 炭そ病・輪紋病・シンクイムシ被害果を見つけ次第、適正に処分する。
6. 薬剤散布は散布間隔に注意し、適期に薬剤散布を実施する。

◆りんご栽培日誌の提出について

りんご出荷予定の方は期日まで提出されますようご協力ください。

1. 提出要領：10月13日（火）までに地区役員さんまで提出してください。
※役員さんは10月14日（水）までに各流通センター・共選所まで提出してください。
※各個人より、各流通センター・共選所まででもよい。この場合、役員さんに直接持込の連絡をしてください。
2. 留意事項
 - 1) 今回提出用の栽培日誌を返却いたしますので、記入不備の無いよう注意ください。
1回目提出の無い方は、お持ちの栽培日誌を提出ください。
 - 2) 最終防除まで記入して下さい。
 - 3) 日誌をチェックし法的に問題がある場合は、荷受けはできません。
 - 4) 日誌を提出せずに出荷した場合は、日誌提出並びにチェックを受けるまで、荷受・選果・販売はできません。

◆品質向上対策について

品質向上対策として、必要に応じて、下記葉面散布肥料を散布する。

1. 使用時期：第15回薬剤散布に混用使用（単用使用してもよい）
ふじは、第15回薬剤散布後、10～14日後にもう一度単用で実施
2. 使用資材：調合量1000ℓ当り ※液肥は、ラベルに記載が無い場合、展着剤不要です。
【品質向上対策】※液肥は、ラベルに記載が無い場合、展着剤不要です。

資材名	使用倍率	調合量
オルガミン	2,000倍	50ml
ケルパック66	1,000倍	100g
友果	500～1,000倍	200～100g

+

資材名	使用倍率	調合量
色一番E	1,000～2,000倍	100～50g
サンカラー	1,000倍	100ml
メリット赤	500倍	200g
カルビタP	770倍	130g

◆第 15 回薬剤散布について

1. 散布時期：10月1日（木）～7日（水）

実際散布月日 月 日

2. 使用薬剤（混用順記載）※調合量1000当たり・10a 当たり散布量：5000以上

農薬名	使用倍率	調合量	収穫前	病害虫
展 着 剤	10,000倍	10ml	—	—
ストライド顆粒水和剤	1,500倍	66g	前日	斑点落葉病・黒星病・すす斑病・すす点病

3. 散布上の留意事項

- 1) 果面の汚れ軽減のため、通常展着剤に代えて、展着剤ササラ 2,000 倍（水 1000 当たり 50ml）又はスカッシュ 1,000 倍（水 1000 当たり 100ml）を使用してもよい。
- 2) ストライド顆粒水和剤に代えて、クプロシールド 1,000 倍（水 1000 当たり 100ml）を使用してもよい。ただし、銅剤のため、葉焼けのような薬害が発生する可能性があるが、特に問題はない。
- 3) ストライド顆粒水和剤は高温時に使用すると薬害が発生する場合がありますので、涼しい日を選んで（当日だけでなく翌日も）使用する。

◆炭そ病・輪紋病対策について

一部で、炭そ病・輪紋病の発病がみられるが、今後は耕種的防除となる。炭そ病は、樹上に残っていると、雨で二次感染するため自園の状況を確認し、発見次第、被害果を取り除く事が重要。

◆シナノゴールド出荷用ノバシートについて

シナノゴールドを出荷時に使用するノバシートを貸出します。なお、品種問わず利用しているセンターは、通常通り使用ください。

1. 配布時期：シナノゴールド収穫講習会頃より配布
2. 配布場所：各流通センター・共選所
3. 留意事項：

- ①回転させて使用しますので、出荷者皆さんで使えるよう都度出荷に必要な分とします。
- ②使用は、1段1枚。3段入れなら3枚です。側面は使用しません。
- ③コンテナより果実が出てしまう場合は、2段詰めとして下さい。
- ④出荷終了後は、早急に返却をお願い致します。例年出荷終了し、かなり経過してからの返却がありますが、適正管理のため、お忘れのないようお願い致します。

◆シナノスイート・シナノゴールド収穫及び出荷目揃い会について

開催日	曜	開催時間	開催場所	担当
10月 5日	月	午前11:00	篠ノ井 西部流通センター	徳武
		午後 1:30	篠ノ井 塩崎集荷所	徳武
		午後 2:00	更北 真島フルーツセンター	根津
		午後 3:00	篠ノ井 有旅集荷所	徳武
10月 6日	火	午前11:00	若穂 若穂果実流通センター	寺澤

◆シナノホッペ収穫及び出荷目揃い会について

開催日	曜	開催時間	開催場所	担当
10月22日	木	午前11:00	若穂 若穂果実流通センター	寺澤
		午後 2:00	更北 真島フルーツセンター	根津
10月23日	金	午後 1:30	篠ノ井 西部流通センター	徳武