

# もも 通常出荷基準

J A グリーン長野営農販売部

| 項目  | 病害虫・障害等          | 症 状                         | 通 常 出 荷  | 格 外      |
|-----|------------------|-----------------------------|--|----------|
| 階級  |                  | 大きさ                         | ・基本:白鳳系25玉まで 白桃系22玉まで  | ・左記以下のもの |
| 着色  |                  | 色                           | ・着色している  | ・ほぼ着色がない |
| 熟度  |                  | 未熟果の収穫はしない                  | ・適熟  | ・過熟      |
| 病害虫 | せん孔細菌病           | 黒褐色で果肉に食い込む<br>ひどいと裂果       | ・赤道下部で、小さい病斑6ヶまで。大きいものは半分<br>・赤道上部で、小さい病斑で果肉に食い込んでおらず、小さいもの、2ヶまで<br>・大きい病斑は6mm程度までで、病斑が深くないもの                            | ・左記以上のもの |
|     | 果実腐敗病            | 灰星病・ホモプシス腐敗病・炭そ病等           | ・ないもの  | ・あるもの    |
|     | 黒星病              | 黒褐色の小斑点                     | ・赤道下部で、小さい病斑5ヶまで   | ・左記以上のもの |
|     | カイガラムシ           | 赤い斑点<br>白抜け斑点               | ・全体で、斑点5ヶまで<br>・果柄部の肉が見えないもの。虫がついていないもの<br>・果柄部が白く又は黒くなっているものは、軽微なもの   | ・左記以上のもの |
|     | ミカンキイロアザミウマ      | 細かい斑点状に白く色抜けする<br>縫合線に沿って多い | ・親指で隠れる程度まで。   | ・左記以上のもの |
|     | アブラムシ            | 果柄部のまわりが、黒くなる               | ・果柄部まわりが少しだけ、黒くなっているものまで   | ・左記以上のもの |
|     | シンクイムシ・ハマキムシ・メイガ | 果実食入・果実ナメリ                  | ・ないもの  | ・あるもの    |
| 障害  | サビ               |                             | ・直径1.5cm程度まで。  | ・左記以上のもの |
|     | 小ヒビ              | 老木に多い                       | ・1～5mm程度の小さいヒビで、果頂部40%までで、<br>果肉がはっきり見えなく、柔らかくなっていないもの   | ・左記以上のもの |
|     | 果頂部の肌荒れ          | 老木に多い                       | ・果頂部で10%程度までで、肌荒れ部が、柔らかくなっていないもの   | ・左記以上のもの |
|     | 縫合線の青味           | 果形も変形しているものに多い              | ・青味部分が強いものは、親指で隠れる程度まで<br>薄いものは、親指2本で隠れる程度まで   | ・左記以上のもの |
|     | 日焼け              |                             | ・赤道部より下で、直径2cm位までで、柔らかくなっていないもの  | ・左記以上のもの |
|     | 核割れ              | 果実の大きさによる                   | ・果柄部（ほぞ）が残っており、割れが幅4mm（爪楊枝2本）までのもの<br>・上からみて6：4未満の変形<br>・水がしたたり落ちないもの  | ・左記以上のもの |
|     | 傷跡・枝跡・枝スレ        |                             | ・直径1.5cm程度までで、果皮が裂けていなく、柔らかくなっていないもの   | ・左記以上のもの |
|     | 果柄部内の皮剥け         | 収穫時等に裂ける                    | ・僅か剥けているもので、変色していないもの  | ・左記以上のもの |
|     | 縫合線のくぼみ（裂果）      |                             | ・幅3mm、長さ10mm以内のもので、果肉まで裂けていないもの  | ・左記以上のもの |
| その他 | 葉斑               | 液の跡がつく                      | ・極端にひどくないもの  | ・左記以上のもの |
|     | 鳥の糞              | 拭いても落ちない                    | ・水で洗浄しないと、汚れが落ちない。果皮を傷めないよう注意する  | ・左記以上のもの |
| 災害  | 雹害               | 打撲・裂傷(生キズ)                  | ・腐れの心配が無く、乾いている物<br>・赤道部より下で、長さ2mm程度で5ヶまで。長さ5mm程度のなら2～3ヶまで<br>幅1mm程度まで、深さ1mm程度まで<br>・痕が深くなく、裂けていないもの。濡れていないもの。腐れの心配にないもの | ・左記以上のもの |

# ネクタリン 通常出荷基準

J A グリーン長野営農販売部

| 項目  | 病害虫名・障害等         | 症 状                     | 通 常 出 荷   | 格 外      |
|-----|------------------|-------------------------|---|----------|
| 階級  |                  | 大きさ                     | ・M以上のもの（90g程度以上）  | ・左記以下のもの |
| 着色  |                  | 色                       | ・着色している   | ・ほぼ着色がない |
| 熟度  |                  | 未熟果の収穫はしない              | ・適熟   | ・過熟      |
| 病害虫 | せん孔細菌病           | 黒褐色で果肉に食い込むひどいと裂果       | ・赤道下部で、小さい病斑6ヶまで。大きいものは半分<br>・赤道上部で、小さい病斑で果肉に食い込んでおらず、小さいもの、2ヶまで<br>・大きいも病斑は6mm程度までで、病斑が深くないもの  | ・左記以上のもの |
|     | 果実腐敗病            | 灰星病・ホモプシス腐敗病・炭そ病等       | ・ないもの   | ・あるもの    |
|     | 黒星病              | 黒褐色の小斑点                 | ・赤道下部で、小さい病斑5ヶまで  | ・左記以上のもの |
|     | カイガラムシ           | 赤い斑点<br>白抜け斑点           | ・全体で、斑点5ヶまで<br>・果柄部の肉が見えないもの。虫がついていないもの<br>・果柄部が白く又は黒くなっているものは、軽微なもの  | ・左記以上のもの |
|     | ミカンキイロアザミウマ      | 細かい斑点状に白く色抜けする縫合線に沿って多い | ・親指で隠れる程度まで   | ・左記以上のもの |
|     | アブラムシ            | 果柄部のまわりが、黒くなる           | ・果柄部まわりが少しだけ、黒くなっているものまで  | ・左記以上のもの |
|     | シンクイムシ・ハマキムシ・メイガ | 果実食入・果実ナメリ              | ・ないもの   | ・あるもの    |
| 障害  | サビ               |                         | ・極端でないもの  | ・左記以上のもの |
|     | 小ヒビ              | 老木に多い                   | ・1～5mm程度の小さいヒビで、果頂部40%までで、果肉がはっきり見えなく、柔らかくなっていないもの  | ・左記以上のもの |
|     | 果頂部の肌荒れ          | 老木に多い                   | ・果頂部で10%程度までで、肌荒れ部が、柔らかくなっていないもの  | ・左記以上のもの |
|     | 日焼け              |                         | ・赤道部より下で、直径2cm位までで、柔らかくなっていないもの   | ・左記以上のもの |
|     | 核割れ              | 果実の大きさによる               | ・果柄部（ほぞ）が残っており、割れが幅4mm（爪楊枝2本）までのもの<br>・上からみて6：4未満の変形<br>・水がしたたり落ちないもの<br>〔B荷受〕<br>・果柄部（ほぞ）がなく、割れが幅3～4mm程度までで、果実の中身がはっきりみえないもの   | ・左記以上のもの |
|     | 傷跡・枝跡・枝スレ        |                         | ・直径1.5cm程度までで、果皮が裂けていなく、柔らかくなっていないもの  | ・左記以上のもの |
|     | 果柄部内の皮剥け         | 収穫時等に裂ける                | ・僅か剥けているもので、変色していないもの   | ・左記以上のもの |
|     | 縫合線のくぼみ（裂果）      |                         | ・幅3mm、長さ10mm以内のもので、果肉まで裂けていないもの   | ・左記以上のもの |
| その他 | 薬斑               | 液の跡がつく                  | ・極端にひどくないもの   | ・左記以上のもの |
|     | 鳥の糞              | 拭いても落ちない                | ・水で洗浄しないと、汚れが落ちない。果皮を傷めないよう注意する   | ・左記以上のもの |
| 災害  | 雹害               | 打撲・裂傷（生キズ）              | ・赤道部より下で、長さ2mm程度で5ヶまで。長さ5mm程度のなら2～3ヶまで幅1mm程度まで、深さ1mm程度まで<br>・痕が深くなく、裂けていないもの。濡れていないもの。腐れの心配がないもの<br>〔B荷受〕<br>・赤道部より下で、痕が深くない（幅・深さ1mm程度）もの。濡れていないもの<br>・〔25玉以下の果実〕痕は、長さ2mm程度で2ヶまで。長さ5mm程度のなら1ヶまで<br>・〔22玉以上果実〕痕は、長さ2mm程度で4ヶまで。長さ5mm程度のなら2ヶまで | ・左記以上のもの |

## もも・ネクタリン 直売用・軽微な電害果・せん孔被害果 出荷基準

これなら、自分でもお金を出して「買う」と思う品質のもの。

傷・病害虫の被害果等で、市場出荷用には入れられない。でもネクター等にするにはおいしい物。知人に差し上げても良いと思う桃・ネクタリン・黄金桃の荷受けをいたします。

JAグリーン長野営農販売部

| 項目  | 病害虫名・障害等     | 症 状                         | 通 常 出 荷  | 格 外      |
|-----|--------------|-----------------------------|--|----------|
| 階級  |              |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・〔もも〕 13～18玉 3k段ボールに6個～12個入る大きさまで</li> <li>・〔ネクタリン〕 22玉 (230g以上)</li> </ul>   | ・左記以下のもの |
| 着色  |              |                             | ・着色している  | ・ほぼ着色がない |
| 熟度  |              | 未熟果の収穫はしない                  | ・適熟  | ・過熟      |
| 病害虫 | せん孔細菌病       | 黒褐色で果肉に食い込む<br>ひどいと裂果       | ・1mm程度の病斑で15ヶ程度まで。5mm程度の病斑なら7～8ヶ程度まで   | ・左記以上のもの |
|     | 果実腐敗病        | 灰星病・ホモプシス腐敗病・炭そ病等           | ・ないもの  | ・あるもの    |
|     | 黒星病          | 黒褐色の小斑点                     | ・赤道下部で、小さい病斑5ヶまで   | ・左記以上のもの |
|     | カイガラムシ       | 赤い斑点。<br>白抜け斑点              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・全体で、斑点10ヶまで</li> <li>・果柄部の肉が見えないもの。虫がついていないもの</li> <li>・果柄部が白く又は黒くなっているものは、軽微なもの</li> </ul>  | ・左記以上のもの |
|     | ミカンキイロアザミウマ  | 細かい斑点状に白く色抜けする<br>縫合線に沿って多い | ・被害面積が、全体の20%以下。虫がいないこと  | ・左記以上のもの |
|     | アブラムシ        | 果柄部のまわりが、黒くなる               | ・果柄部まわりがひどく、黒くなっていないもの   | ・左記以上のもの |
| 障害  | サビ           |                             | ・全体で20%以下の面積まで   | ・左記以上のもの |
|     | 小ヒビ          | 老木に多い                       | ・乾燥していること。小ヒビは、1mm～5mm程度の小さいヒビは散らばっていれば、果頂部の60%程度までよい  | ・左記以上のもの |
|     | 果頂部の肌荒れ      | 老木に多い                       | ・果頂部で30%程度までで、肌荒れ部が、柔らかくならないもの   | ・左記以上のもの |
|     | 縫合線の青味       | 果形も変形しているものに多い              | ・極端でなく、食味に大きな影響がないもの   | ・左記以上のもの |
|     | 日焼け          |                             | ・赤道部より下で、直径2cm位までで、柔らかくならないもの  | ・左記以上のもの |
|     | 核割れ          | 果実の大きさによる                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・〔もも〕 上から見て、6：4以上になっていないこと</li> <li>・〔ネクタリン〕 上から見て、6：4以上になっていないこと</li> <li>ホゾがついていないくとも、中身が見えていないこと</li> </ul>  | ・左記以上のもの |
|     | 傷跡・枝跡・枝スレ    |                             | ・乾いていること。  | ・左記以上のもの |
|     | 果柄部内の皮剥け     | 収穫時等に裂ける                    | ・僅か剥けているもので、変色していないもの  | ・左記以上のもの |
|     | 縫合線のくぼみ (裂果) |                             | ・幅3mm、長さ10mm以内のもので、果肉まで裂けていないもの  | ・左記以上のもの |
|     | 電害           | 打撲・裂傷(生キズ)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・痕が深くなく、裂けていないもの、濡れていないもの</li> <li>・腐れの心配が無く、乾いている物</li> </ul><br>〔もも〕 長さ2mm程度で15ヶ程度まで。長さ5mm程度のなら7～8ヶ程度まで<br>幅・深さ2mm程度まで<br>〔ネクタリン〕 25玉以下：長さ1mm程度で2ヶまで。5mm程度なら1ヶまで<br>22玉以上：長さ1mm程度で4ヶまで。5mm程度なら2ヶまで<br>幅・深さ2mm程度まで | ・左記以上のもの |