『シナノスイート・ゴールド』収穫及び出荷目揃い会資料

令和８年１０月

JA グリーン長野営農販売部

１． 共通生育状況

果実の成熟は、開花が早かった事から進んでいるが、８月下旬からの天候不順で糖度は低く推移し、落果もみられる。７～８月の高温により日焼け果が多くみられ、病害虫はシンクイムシ類被害が散見される。

２． 共通留意事項

シナノスイートは、高温条件下では着色・成熟が遅延する、シナノゴールドは、高温条件下では成熟が早まっている事が明らかになってきた。

よって、シナノスイートは、以前より、収穫期が遅くなってきており、早採りは、食味低下などにつながる可能性がある。逆にシナノゴールドは、成熟が早まってきている。このため、両品種は、同時期の収穫となると考えて、収穫する。

３． 収穫適期の判断、目安

【シナノスイート】

１）適熟品の品質基準

①糖度：１４度以上　　②酸度：酸度は０.３％前後　　③硬度：１３ポンド程度

④食味：とにかく食べてみて、これならというものを収穫・出荷する。

（食べられる・・と美味しいは違うので注意する）

２）収穫目安

① 満開後：１６０～１７５日頃から。平坦地で１０月３日頃から目安。

②外観上：

・果実全面が赤～濃赤色になる。　　・地色が抜けてくる。

３）注意点

①標高の高い地域では、着色良好となるので、未熟果を収穫しないよう注意する。
平坦地では、着色に比べて、硬度の低下、デンプン消失が先行するので、適期を逃さないよう注意する。

②成熟は、高密植・新わい化→わい性や弱樹勢樹→普通樹→若木・強樹勢、順次収穫を行う。

③強樹勢の樹や枝ほど、果実肥大し、着色不良、日持ちが悪くなるので、注意する。
逆に小玉は、日持ちがよいので、慌てず、着色食味を確認しながら。

④一挙収穫はしない。樹の中でも、複数回に分けて収穫を行う。

⑤芯かび果の発生があるので、早くから着色し、ワックス（油）が発生している果実は、排除する。

⑥しわ果の発生があるので、日当たりが良すぎる部位は、注意する。

⑦果実が軟らかいため、収穫時以降、押し傷等にならないよう、丁寧に取り扱う。

【シナノゴールド】

1）適熟品の品質基準

①糖度：１４～１５度以上　　②酸度：酸度は０.４～０.５%前後

③硬度：１４～１５ポンド程度

④食味：とにかく食べてみて、これならというものを収穫・出荷する。酸味に注意！

（食べられる・・と美味しいは違うので注意する）

2）収穫目安

①満開後：１６０～１６５日頃から。平坦地で１０月４日頃から目安。

②外観上：

・果実全面が緑黄～黄色になる。（尻側まで）

・ワックス（油）が発生し、指を滑らせた時に、ひっかからない。

③内観上：果肉が黄白色（クリーム色）を帯びる。

3）注意点

①赤く着色しない黄色品種のため、日焼けによる黄色に惑わされず、食味を確認し、収穫開始する。また、種周りに緑色のスジが見えるようではまだ早い。

②成熟は、高密植・新わい化→わい性や弱樹勢樹→普通樹→若木・強樹勢、順次収穫を行う。着果量が多いと、熟期が遅れる・黄色を帯びてこないので、注意する。（結果、収穫が遅くなり、裂果を助長する。）

③着果量が多い、強樹勢の樹や枝ほど、果形が悪い（縦長で尻が細い）ので熟期が遅れる。

④枝下の花芽の果実は、いつまでたっても、黄色を帯びず、食味が上がらないものがあるので、排除する。

⑤裂果が多い品種。大玉（２８玉位以上や、側果利用）は、特に注意が必要。

⑥日焼け部位や、収穫が遅くなっていくと、横ヒビが発生しやすい。ヒビ部分から軟化や、イタミが発生するので、収穫を早める。

⑦摘果し忘れた、逆さ実・横向き果は、日焼けや裂果が激しいので、注意する。

⑧一挙収穫はしない。樹の中でも、複数回に分けて収穫を行う。

⑨ワックスが著しくヌルヌルになってきたら、収穫を急ぐ。

⑩赤色斑点は、日焼け部位中心に発生する。収穫が遅れないようにする。

⑪打撲が出やすく、目立つ品種。収穫時以降、押し傷等にならないよう、丁寧に取り扱う。収穫かごに沢山いれない。いれるときも、やさしくそっと。コンテナに入れる時も、最新の注意を。ノバシートは、必ず使用。

⑫縦長品種なので、コンテナに３段入らない場合は、２段で入れる。

４.共通荷受　◆各センター・共選所の計画通りとする。

５.出荷基準

1）普通（生果）出荷　⇒　２００g(５０玉)以上を出荷する。























【シナノスイート】糖度１３度以上。以下は、センサー格外。

【シナノゴールド】糖度１２.５度以上。以下は、センサー格外。



















2）オープン箱出荷・特別コンテナ出荷　⇒　別紙参照。

3）加工関係　⇒　各流通センター・共選所による

りんご　出荷規格早見表　No.1

症状	生果用出荷	オープン箱出荷 特別コンテナ	症状	生果用出荷	オープン箱出荷 特別コンテナ
つるサビ	 真上から見て、40%以内。肩から流れでない。僅かなすじ状はよい。	 左記以上で、生食できる。 真上から見て、赤みがある。	ツル割れ	 すじ2本で軽微なもの。幅2㎜1本。 極端に深くない。内部裂果ない。	 肩より内に収まっており、 幅3㎜2ヶ。幅2㎜3ヶ。 極端に深くない。内部裂果ない。
胴サビ	 平滑で散在している。 凸凹状は、直径1㎝以内。 塊りは、500玉以内。	 左記以上で、生食できる。	尻割れ	 尻の中で収まっており、幅2㎜2本。	 尻まで上がっており 幅2㎜4本、幅3㎜3本。
尻サビ	 真下から見て、がくあ部（尻）以内。 胴まで流れ出でるもんは、 胴サビとして判断。	 左記以上で、生食できる。	日焼け	 淡桃色で1円玉程度。 腐れの心配のない。	左記に準じる
スジサビ	 細いもの3本。太いもの1本。	 左記以外で、生食できる。	オレンジ色日焼け	 真横から見て、面30%以内。 極端に濃くなく、果肉がボコボコ していない。腐れの心配のない。	左記に準じる
枝スレ・キズ	 全体で2ヶ。赤道上部1ヶ。 10㎜程度で、生でない。	 全体で3ヶ。 20㎜程度で、生でない。	ゾウ鼻	 極端に隆起していない。	 極端に隆起している。
打撲	 小指の頭程度。 褐変してない、腐れの心配のない。	 人差し指の頭程度。 褐変してない、腐れの心配のない。	生理障害	 ピターピット、ジョナサンスポット ないもの。 ただし、コルクスポットは、1ヶ。	 ピターピット、ジョナサンスポット ないもの。 ただし、コルクスポットは、2ヶ。

りんご　出荷規格早見表　No.2

症状	生果用出荷	オープン箱出荷 特別コンテナ	症状	生果用出荷	オープン箱出荷 特別コンテナ
ほぞの黒緑色斑点	秋映  5㎜程度まででで3ヶ。	秋映  左記以上。	雹害（裂傷）	 肉がのっており、サビ状になっている。 傷が乾いており、腐れの心配がなく 指で押しても陥没しない。	 サビ・かさぶた状になっており 腐れの心配のない。 シンクイムシなど虫害のない
赤色斑点（斑点）	シナノG  斑点のみのものは、 全体で5ヶ。赤道上部2ヶ。	シナノG  斑点のみのものは、 多きく目立つもので 果肉に影響のない。	雹害（打撲）	 マッチ棒の頭の大きさで、 全体で4ヶまで。 腐れの心配なく、指で押しても陥没しない	 サビ・かさぶた状になっており 腐れの心配のない。 シンクイムシなど虫害のない
赤色斑点（混合）	シナノG  斑点・染みを伴うものは、 極端に濃くなく 全体の30%以内。	シナノG  斑点・染みを伴うものは、 多きく目立つもので 果肉に影響のない。	斑点落葉病・褐斑病	 直径0.5㎜まででで、全体で7ヶまで 赤道上部3ヶまで。ただし、大きいもの半分。	左記に準じる
カメムシ・セミ	 カメムシ：赤道下部で1ヶまで セミ：ないもの	 カメムシ：赤道下部で3ヶまで セミ：赤道下部1ケまで。	黒点病	 直径0.3㎜まででで、全体で12ヶまで 赤道上部6ヶまで。ただし、大きいもの半分。	左記に準じる
			黒星病	 直径3㎜まででで、赤道下部2ヶまで	 直径5㎜まででで、全体で3ヶまで 直径8㎜まででで、全体で1ヶまで
その他	横ヒビ：果肉に達していないもの。 ツル（ホゾ）抜け：抜け・折れよい。 変形果：著しく変形していない。また、平な場所で立つ。 尻コケ：極端でないもの。 過熟（ボケ）：ないもの 青味果（「ふじ」ひかり玉・つるつる果、「シナノゴールド」果点なし）：ないもの 葉影・枝影：あってもよい。 炭そ病・輪紋病等腐敗病：ないもの。 シンクイムシ類・ハマキムシ類：ないもの ヤガ類：ないもの 鳥害：ないもの	左記に準じる	すす斑・点病	 すす斑病：ないもの（吹き落す） すす点病：1円玉以内。	 すす斑病：ないもの（吹き落す） すす点病：500円玉以内。

②規格外　過熟・未熟・病害虫(シンクイ・ヤガ・炭そ病等)　等