# 『シナノホッペ』収穫及び出荷目揃い会資料

令和８年１０月

JA グリーン長野営農販売部

## １． 生育状況

果実の成熟は、昨年より早い。９月の天候不順により、割れ発生が心配される。

## ２． 収穫適期の判断、目安

早採りのものは肉質が粗雑で酸味・渋味が強いため、食味を確認して収穫する。

１）適熟品の品質基準

①糖度：１５度以上　　②酸度：酸度は０.４%前後

③硬度：１７ポンド程度

④食味：とにかく食べてみて、これならというものを収穫・出荷する。蜜入りにこだわり過ぎないように、注意する。

（食べられる・・と美味しいは違うので注意する）

２）収穫目安

①満開後：１８５～１９０日頃から。平坦地で１０月２４日頃から目安。

②外観上：果実全面が紫紅色になる。

③内観上：蜜入りが良い品種。蜜入り指数３以上が目安（図参照）だが、食味が良くなっていれば以下でもよい。

３）注意点

①着色先行の品種。着色だけだと、食味が伴っていないので、惑わされず、食味を確認し、収穫開始する。

②成熟は、→わい性や弱樹勢樹→普通樹→若木・強樹勢、順次収穫を行う。

③強樹勢の樹や枝ほど、果形が悪い（斜形・扁平）する。

④一挙収穫はしない。樹の中でも、複数回に分けて収穫を行う。

⑤等級は、蜜入り程度により、区分されるが、十分蜜入りしている「蜜有」にこだわらなくてよい。前述の通り、食味が乗っていれば、蜜入り指数１～２程度も、収穫する。

## ３.荷受

◆各センター・共選所の計画通りとする。


## ４.出荷基準

１）普通（生果）出荷　⇒　２００ｇ(５０玉)以上を出荷する。糖度１３度以上。以下は、センサー格外。蜜入り程度による格外はない。

２）オープン箱出荷　⇒　別紙参照。

３）加工関係　⇒　各流通センター・共選所による

## 〔図　蜜入り指数〕
























1．無……蜜が全く入っていないもの
2．少……点々と入り始めたもの
3．中……点々が放射状になったもの

# りんご　出荷規格早見表　No.1

| 症状 | 生果用出荷 | オープン箱出荷<br>特別コンテナ | 症状 | 生果用出荷 | オープン箱出荷<br>特別コンテナ |
|---|---|---|---|---|---|
| つるサビ | 真上から見て、40%以内。肩から流れでない。僅かなすじ状はよい。 | 左記以上で、生食できる。<br>真上から見て、赤みがある。 | ツル割れ | すじ2本で軽微なもの。2㎜程度は1本。<br>極端に、深くない。また、内部裂果ない。 | 肩より内に収まっており、<br>幅3㎜2ヶ。幅2㎜。<br>極端に、深くない。また、内部裂果ない。 |
| 胴サビ | 平滑で散在している。<br>凸凹状は、直径1㎝以内。<br>塊りは、500玉以内。 | 左記以上で、生食できる。 | 尻割れ | 尻の中で収まっており、幅2㎜2本。 | 尻まで上がっており<br>幅2㎜程度は4本、幅3㎜程度は3本。 |
| 尻サビ | 真下から見て、がくあ部（尻）以内。<br>胴まで流れ出でるもんは、<br>胴サビとして判断。 | 左記以上で、生食できる。 | 日焼け | 淡桃色で1円玉程度。腐れの心配のない。 | 左記に準じる |
| スジサビ | 細いもの3本。太いもの1本。 | 左記以外で、生食できる。 | オレンジ色日焼け | 真横から見て、面30%以内。<br>極端に濃くなく、果肉がボコボコ<br>していない。腐れの心配のない。 | 左記に準じる |

# りんご　出荷規格早見表　No.2

| 症状 | 生果用出荷 | オープン箱出荷<br>特別コンテナ | 症状 | 生果用出荷 | オープン箱出荷<br>特別コンテナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 枝スレ・キズ | <br>全体で2ヶ。赤道上部1ケ。<br>10㎜程度で、生でない。 | <br>全体で3ヶ。<br>20㎜程度で、生でない。 | 雹害（裂傷） | <br>肉がのっており、サビ状になっている。<br>傷が乾いており、腐れの心配がなく<br>指で押しても陥没しない。 | <br>サビ・かさぶた状になっており<br>腐れの心配のない。<br>シンクイムシなど虫害のない |
| 打撲 | <br>小指の頭程度。<br>褐変してない、腐れの心配のない。 | <br>人差し指の頭程度。<br>褐変してない、腐れの心配のない。 | 雹害（打撲） | <br>マッチ棒の頭の大きさで、<br>全体で4ヶまで。<br>腐れの心配なく、指で押しても陥没しない | <br>サビ・かさぶた状になっており<br>腐れの心配のない。<br>シンクイムシなど虫害のない |
| ゾウ鼻 | <br>極端に隆起していない。 | <br>極端に隆起している。 | 斑点落葉病・褐斑病 | <br>直径0.5㎜までで、全体で7ヶまで<br>赤道上部3ヶまで。ただし、大きいもの半分。 | 左記に準じる |
| 生理障害 | <br>ピターピット、ジョナサンスポットないもの。<br>ただし、コルクスポットは、1ケ。 | <br>ピターピット、ジョナサンスポットないもの。<br>ただし、コルクスポットは、2ケ。 | 黒点病 | <br>直径0.3㎜までで、全体で12ヶまで<br>赤道上部6ヶまで。ただし、大きいもの半分。 | 左記に準じる |
| カメムシ・セミ | <br>カメムシ：赤道下部で1ヶまで<br>セミ：ないもの | <br>カメムシ：赤道下部で3ヶまで<br>セミ：赤道下部1ケまで。 | 黒星病 | <br>直径3㎜までで、赤道下部2ヶまで | <br>直径5㎜までで、全体で3ヶまで<br>直径8㎜までで、全体で1ヶまで |
| その他 | 横ヒビ：果肉に達していないもの。<br>ツル（ホゾ）抜け：抜け・折れよい。<br>変形果：著しく変形していない。また、平な場所で立つ。<br>尻コケ：極端でないもの。<br>過熟（ボケ）：ないもの<br>青味果（「ふじ」ひかり玉・つるつる果、「シナノゴールド」果点なし）：ないもの<br>葉影・枝影：あってもよい。<br>炭そ病・輪紋病等腐敗病：ないもの。<br>シンクイムシ類・ハマキムシ類：ないもの<br>ヤガ類：ないもの<br>鳥害：ないもの | 左記に準じる | すす斑・点病 | <br>すす斑病：ないもの（吹き落す）<br>すす点病：1円玉以内。 | <br>すす斑病：ないもの（吹き落す）<br>すす点病：500円玉以内。 |

②変形果：斜形３０度まで。船形パックに入る程度（縦横差１㎝程度）まで。

③規格外　過熟・未熟・病害虫(シンクイ・ヤガ・炭そ病等)　等