『王林』収穫及び出荷目揃い会資料

令和８年１０月

JA グリーン長野営農販売部

１． 収穫適期の判断、目安

早採りのものは肉質が粗雑で酸味・渋味が強いため、食味を確認して収穫する。

１）適熟品の品質基準

①糖度：１５度以上　　②酸度：酸度は０.３%前後

③硬度：１４～１５ポンド程度

④食味：とにかく食べてみて、これならというものを収穫・出荷する。酸味に注意！

（食べられる・・と美味しいは違うので注意する）

２）収穫目安

①外観上：

・地色が抜け、黄色を帯びる。　　・果面に細かなヒビが出始める。

②内観上：

・デンプン、渋みが抜ける。

３）注意点

①青く（緑色が強い)、表面がつるつるしているものは、未熟。

②尻がこけているものは、収穫を遅らせる。

③ビターピット（カルシウム欠乏）がでやすい品種のため、注意する。特に大玉。

２.荷受

◆各センター・共選所の計画通りとする。

３.出荷基準















１）普通（生果）出荷　⇒　２００g(５０玉)以上を出荷する。

２）オープン箱出荷　　⇒　別紙参照。





















３）雹害オープン箱出荷　　⇒　下記基準による。伝票には、品種名+雹害と必ず記入する。

４）加工関係　　⇒　各流通センター・共選所による

りんご　出荷規格早見表　No.1

症状	生果用出荷	オープン箱出荷 特別コンテナ	症状	生果用出荷	オープン箱出荷 特別コンテナ
つるサビ	 真上から見て、４０％以内。肩から流れでない。僅かなすじ状はよい。	 左記以上で、生食できる。 真上から見て、赤みがある。	ツル割れ	 すじ2本で軽微なもの。2㎜程度は1本。 極端に、深くない。また、内部裂果ない。	 肩より内に収まっており、 幅3㎜2ヶ。幅2㎜。 極端に、深くない。また、内部裂果ない。
胴サビ	 平滑で散在している。 凸凹状は、直径1㎝以内。 塊りは、５００玉以内。	 左記以上で、生食できる。	尿割れ	 尿の中で収まっており、幅2㎜2本。	 尿まで上がっており 幅2㎜程度は4本、幅3㎜程度は3本。
尿サビ	 真下から見て、がくあ部（尿）以内。 胴まで流れ出でるもんは、 胴サビとして判断。	 左記以上で、生食できる。	日焼け	 淡桃色で1円玉程度。腐れの心配のない。	左記に準じる
スジサビ	 細いもの3本。太いもの１本。	 左記以外で、生食できる。	オレンジ色日焼け	 真横から見て、面30％以内。 極端に濃くなく、果肉がボコボコ していない。腐れの心配のない。	左記に準じる

りんご　出荷規格早見表　No.2

症状	生果用出荷	オープン箱出荷 特別コンテナ	症状	生果用出荷	オープン箱出荷 特別コンテナ
枝スレ・キズ	 全体で2ヶ。赤道上部1ケ。 10㎜程度で、生でない。	 全体で3ヶ。 20㎜程度で、生でない。	雹害（裂傷）	 肉がのっており、サビ状になっている。 傷が乾いており、腐れの心配がなく 指で押しても陥没しない。	 サビ・かさぶた状になっており 腐れの心配のない。 シンクイムシなど虫害のない
打撲	 小指の頭程度。 褐変してない、腐れの心配のない。	 人差し指の頭程度。 褐変してない、腐れの心配のない。	雹害（打撲）	 マッチ棒の頭の大きさで、 全体で4ヶまで。 腐れの心配なく、指で押しても陥没しない	 サビ・かさぶた状になっており 腐れの心配のない。 シンクイムシなど虫害のない
ゾウ鼻	 極端に隆起していない。	 極端に隆起している。	斑点落葉病・褐斑病	 直径0.5㎜までで、全体で7ヶまで 赤道上部3ヶまで。ただし、大きいもの半分。	左記に準じる
生理障害	 ビターピット、ジョナサンスポットないもの。 ただし、コルクスポットは、1ケ。	 ビターピット、ジョナサンスポットないもの。 ただし、コルクスポットは、2ケ。	黒点病	 直径0.3㎜までで、全体で12ヶまで 赤道上部6ヶまで。ただし、大きいもの半分。	左記に準じる
カメムシ・セミ	 カメムシ：赤道下部で1ヶまで セミ：ないもの	 カメムシ：赤道下部で3ヶまで セミ：赤道下部1ケまで。	黒星病	 直径3㎜までで、赤道下部2ヶまで	 直径5㎜までで、全体で3ヶまで 直径8㎜までで、全体で1ヶまで
その他	横ヒビ：果肉に達していないもの。 ツル（ホゾ）抜け：抜け・折れよい。 変形果：著しく変形していない。また、平 な場所で立つ。 尻コケ：極端でないもの。 過熟（ボケ）：ないもの 青味果（「ふじ」ひかり玉・つるつる果、 「シナノゴールド」果点なし）：ないもの 葉影・枝影：あってもよい。 炭そ病・輪紋病等腐敗病：ないもの。 シンクイムシ類・ハマキムシ類：ないもの ヤガ類：ないもの 鳥害：ないもの	左記に準じる	すす斑・点病	 すす斑病：ないもの（吹き落す） すす点病：1円玉以内。	 すす斑病：ないもの（吹き落す） すす点病：500円玉以内。

②着色　赤く着色していてもよい。

③規格外　過熟・未熟・病害虫(シンクイ・ヤガ・炭そ病等)　・極端な尻コケ果