

『秋映』 収穫及び出荷目揃い会資料

令和8年9月

JA グリーン長野営農販売部

1. 生育状況

果実の成熟は、開花が早かった事から進んでいるが、8月下旬からの天候不順で糖度は低く推移し、落果もみられる。7～8月の高温により日焼け果が多くみられ、病害虫はシンクイムシ類被害が散見される。

2. 収穫適期の判断、目安

早採りのものは肉質が粗雑で酸味・渋味が強いため、食味を確認して収穫する。

1) 適熟品の品質基準

- ①糖度：14～15度以上 ②酸度：酸度は0.4%前後
- ③硬度：13～14ポンド程度
- ④食味：とにかく食べてみて、これならというものを収穫・出荷する。
(食べられる・・・と美味しいは違うので注意する)

2) 収穫目安

- ①満開後：150～155日頃から。平坦地で9月19日頃から目安。
- ②外観上：
 - ・果実全面が濃赤～暗赤色になる。 ・果実が豊満になり、花おさまりが開く。
 - ・果点がはっきり浮き出て、ワックス（油）が発生し、手にベタ感を感じる。
- ③内観上：果肉が黄色を帯びる。

3) 注意点

- ①着色が良い品種のため、色だけに惑わされず、食味を確認し、収穫開始する。
また、白っぽい果肉で、種周りに緑色のスジが見えるようではまだ早い。
- ②成熟は、高密植・新わい化→わい性や弱樹勢樹→普通樹→若木・強樹勢、順次収穫を行う。
- ③強樹勢の樹や枝ほど、果形が悪い（縦長で尻が細くゴツゴツ）ので熟期が遅れる。
- ④一挙収穫はしない。樹の中でも、複数回に分けて収穫を行う。
- ⑤中生種としては、日持ちは良いが収穫期後半は、過熟になる場合があるので注意する。特にワックスがベタベタからヌルヌルになってきたら、収穫を急ぐ。特に大玉は注意する。
- ⑥摘果し忘れた、逆さ実・横向き果は、日焼けし、内部に高温障害(蜜入)・褐変になりやすい。日持ちが悪いので早めに収穫する。
- ⑦収穫したとき、果実が軽く感じられるものは、内部褐変の可能性があるので注意する。























3. 荷受

◆各センター・共選所の計画通りとする。



















4. 出荷基準

- 1) 普通（生果）出荷 ⇒ 200g(50玉)以上を出荷する。糖度12.5度以上。以下は、センサー格外。
- 2) オープン箱・特別コンテナ出荷 ⇒ 別紙参照。
- 5) 加工関係 ⇒ 各流通センター・共選所による

りんご 出荷規格早見表 No.1

症状	生果用出荷	オープン箱出荷 特別コンテナ	症状	生果用出荷	オープン箱出荷 特別コンテナ
つるサビ	 真上から見て、40%以内。肩から流れでない。僅かなすじ状はよい。	 左記以上で、生食できる。真上から見て、赤みがある。	ツル割れ	 すじ2本で軽微なもの。幅2mm1本。極端に深くない。内部裂果ない。	 肩より内に収まっており、幅3mm2ヶ。幅2mm3ヶ。極端に深くない。内部裂果ない。
胴サビ	 平滑で散在している。凸凹状は、直径1cm以内。塊りは、500玉以内。	 左記以上で、生食できる。	尻割れ	 尻の中で収まっており、幅2mm2本。	 尻まで上がっており、幅2mm4本、幅3mm3本。
尻サビ	 真下から見て、がくあ部(尻)以内。胴まで流れ出でるものは、胴サビとして判断。	 左記以上で、生食できる。	日焼け	 淡桃色で1円玉程度。腐れの心配のない。	左記に準じる
スジサビ	 細いもの3本。太いもの1本。	 左記以外で、生食できる。	オレンジ色日焼け	 真横から見て、面30%以内。極端に濃くなく、果肉がボコボコしていない。腐れの心配のない。	左記に準じる
枝スレ・キズ	 全体で2ヶ。赤道上部1ヶ。10mm程度で、生でない。	 全体で3ヶ。20mm程度で、生でない。	ゾウ鼻	 極端に隆起していない。	 極端に隆起している。
打撲	 小指の頭程度。褐変していない、腐れの心配のない。	 人差し指の頭程度。褐変していない、腐れの心配のない。	生理障害	 ビターピット、ジョナサンスポットないもの。ただし、コルクスポットは、1ヶ。	 ビターピット、ジョナサンスポットないもの。ただし、コルクスポットは、2ヶ。

りんご 出荷規格早見表 No.2

症状	生果用出荷	オープン箱出荷 特別コンテナ	症状	生果用出荷	オープン箱出荷 特別コンテナ
ほぞの黒緑色斑点	秋映  5mm程度までで3ヶ。	秋映  左記以上。	電害（裂傷）	 肉がのっており、サビ状になっている。傷が乾いており、腐れの心配がなく指で押しても陥没しない。	 サビ・かさぶた状になっており腐れの心配のない。シンクイムシなど虫害のない
赤色斑点（斑点）	シナノG  斑点のみのものは、全体で5ヶ。赤道上部2ヶ。	シナノG  斑点のみのものは、多きく目立つもので果肉に影響のない。	電害（打撲）	 マッチ棒の頭の大ききで、全体で4ヶまで。腐れの心配なく、指で押しても陥没しない。	 サビ・かさぶた状になっており腐れの心配のない。シンクイムシなど虫害のない
赤色斑点（混合）	シナノG  斑点・染みを伴うものは、極端に濃くなく全体の30%以内。	シナノG  斑点・染みを伴うものは、多きく目立つもので果肉に影響のない。	斑点落葉病・褐斑病	 直径0.5mmまで、全体で7ヶまで赤道上部3ヶまで。ただし、大きいもの半分。	左記に準じる
カメムシ・セミ	 カメムシ：赤道下部で1ヶまで セミ：ないもの	 カメムシ：赤道下部で3ヶまで セミ：赤道下部1ヶまで。	黒点病	 直径0.3mmまで、全体で12ヶまで赤道上部6ヶまで。ただし、大きいもの半分。	左記に準じる
			黒星病	 直径3mmまで、赤道下部2ヶまで	 直径5mmまで、全体で3ヶまで直径8mmまで、全体で1ヶまで
その他	横ヒビ：果肉に達していないもの。 ツル（ホゾ）抜け：抜け・折れよい。 変形果：著しく変形していない。また、平な場所で立つ。 尻コケ：極端でないもの。 過熟（ボケ）：ないもの 青味果（「ふじ」ひかり玉・つるつる果、「シナノゴールド」果点なし）：ないもの 葉影・枝影：あってもよい。 炭そ病・輪紋病等腐敗病：ないもの。 シンクイムシ類・ハマキムシ類：ないもの ヤガ類：ないもの 鳥害：ないもの		すす斑・点病	 すす斑病：ないもの（吹き落す） すす点病：1円玉以内。	 すす斑病：ないもの（吹き落す） すす点病：500円玉以内。

②規格外 過熟・未熟・病虫害(シンクイ・ヤガ・炭そ病等) 等