

紅玉 収穫及び出荷目揃い会資料

令和8年9月

JA グリーン長野営農販売部

1. 生育状況

本年の生育状況は、開花が早かった事で進んできた。8月下旬からの天候不順で着色・成熟が停滞している。高温干ばつが続いた事により、日焼け果発生している。

2. 収穫適期の判断、目安

早採り果は酸味が強すぎ、逆に遅れるとジョナサンスポットや茶星などの生理障害が発生しやすいので注意する。(カルシウム不足・着果不足)

1. 適熟品の品質基準

1) 糖度：13～14度以上

2. 収穫目安

1) 満開後140～155日以降。平坦地で9月7～22日頃から目安。

3. 注意点

1) 収穫したときに果実が軽く感じられるものは内部褐変果の心配があるので注意する。

2) 日当たりの良すぎる所は内部褐変しやすい。1番採りで注意。

3) 玉肥大が良い場合は軟化しやすいので注意し、適期収穫をはかる。

3. 荷受

◆各センター・共選所の計画通りとする。

4. 出荷基準

1) 普通（生果）出荷




















⇒180g(56玉)以上を出荷する。

2) オープン箱出荷 ⇒別紙参照。

4) 加工関係

⇒各流通センター・共選所による

りんご 出荷規格早見表 No.1

症状	生果用出荷	オープン箱出荷 特別コンテナ	症状	生果用出荷	オープン箱出荷 特別コンテナ
つるさび	 真上から見て、40%以内。肩から流れでない。僅かなすじ状はよい。	 左記以上で、生食できる。 真上から見て、赤みがある。	ツル割れ	 すじ2本で軽微なもの。幅2mm1本。極端に深くない。内部裂果ない。	 肩より内に収まっており、幅3mm2ヶ。幅2mm3ヶ。極端に深くない。内部裂果ない。
胴サビ	 平滑で散在している。 凸凹状は、直径1cm以内。 塊りは、500玉以内。	 左記以上で、生食できる。	尻割れ	 尻の中で収まっており、幅2mm2本。	 尻まで上がっており幅2mm4本、幅3mm3本。
尻サビ	 真下から見て、がくあ部(尻)以内。 胴まで流れ出でるもんは、胴サビとして判断。	 左記以上で、生食できる。	日焼け	 淡桃色で1円玉程度。 腐れの心配のない。	左記に準じる
スジサビ	 細いもの3本。太いもの1本。	 左記以外で、生食できる。	オレンジ色日焼け	 真横から見て、面30%以内。 極端に濃くなく、果肉がボコボコしていない。腐れの心配のない。	左記に準じる
枝スレ・キズ	 全体で2ヶ。赤道上部1ヶ。 10mm程度で、生でない。	 全体で3ヶ。 20mm程度で、生でない。	ゾウ鼻	 極端に隆起していない。	 極端に隆起している。
打撲	 小指の頭程度。 褐変でない、腐れの心配のない。	 人差し指の頭程度。 褐変でない、腐れの心配のない。	生理障害	 ビタービット、ジョナサンスポットないもの。 ただし、コルクスポットは、1ヶ。	 ビタービット、ジョナサンスポットないもの。 ただし、コルクスポットは、2ヶ。

②規格外 過熟・未熟・病虫害(シンクイ・ヤガ・炭そ病等)
その他(農薬の汚れ等)・ジョナサンスポット